

Checklist voor het ringen van Buizerd (*Buteo buteo*)

1. Meet vleugellengte en bepaal aan de hand daarvan de leeftijd,
2. Ringen vanaf levensdag 13 (vleugellengte 73 mm of langer),
3. Indien kleiner: wel meten en wegen, maar 1-2 weken later terugkomen voor ringen (en opnieuw wegen en meten),
4. Ringmaat altijd 11 mm (vrouwtjes met lat. poot groter of gelijk aan 10,5 mm een 13 mm ring),
5. Neem gewicht,
6. Bepaal kropomvang (vul in 0, 1 of 2),
7. Seksen pas mogelijk vanaf levensdag 26 (vleugellengte minimaal 192 mm), en zelfs dan nog niet altijd (zie tabel hieronder),
8. Extra maten nemen, als laterale pootdikte, alleen zinvol bij jongen ouder dan 26 dagen (indien jonger, teveel overlap tussen seksen).

Vleugellengte mm	Leeftijd dagen	Gewicht (krop 0)		Gewicht (krop 1-2)		Laterale tarsus (mm)	
		Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw
<192	<26	-	>760	-	>800		>9.5
192-225	26-30	<600	>800	<700	>850	<9.5	>9.5
>225	>30	<700	>830	<735	>870	<9.7	>10.0

9. Let bij seksen op de onderlinge verschillen binnen een broedsel (soms zijn alle jongen aan de zware kant, of juist te licht),
10. Let bij seksen op de volgorde in het nest; de kleinste jongen kunnen een groeiachterstand hebben opgelopen!

Extra's

11. Noteer en determineer prooiresten en de staat waarin ze verkeren (intact, deels opgegeten restant, afgekloven botten, alleen veren of haren),
12. Weeg en meet intacte prooien (en neem vleugellengte, tarsometatarsus en/of achtervoetje van restanten),
13. Verzamel geruide veren (op nest en in nestomgeving),
14. Verzamel en meet niet-uitgekomen eieren (liggen los in kom).
15. Reken uit wanneer de jongen ongeveer zullen gaan uitvliegen (dag 40), geef aan de inventariseerder door wanneer hij/zij **broedsucces** moet vaststellen.
16. Vul de nestkaart zoveel mogelijk in, ook hoogte nest, boomsoort, perceel, A'foortcoördinaten.